



Ref. : world health organization (W.H.O.)



• الوقاية من كوفيد-19 في أماكن العمل


١. يجب المواطنة على مسح الأسطح (أهل المكاتب والمنادل) والمستلزمات المكتبية مثل الهواتف ولوحات المفاتيح بمطهر.
٢. يجب على أي شخص يعاني من أعراض مشابهة لغيراض الإصابة بالفيروس كالسعال أو الحمى البقاء في المنزل حرضاً على سلامته وسلامة الآخرين.
٣. يجب اتباع ممارسة النظافة التنفسية الجيدة ، والحرص على توافر الكمامات الطبية و / أو المنادل الورقية في مكان العمل كل يحتسب للأفراد الذين يعانون من الرشح أو السعال واستخدامها أثناء العمل - ويجب توفير سلال مهملات لغسل لطمأن التخلص من الكمامات والمنادل بطريقة صحيحة .
٤. المواطنة على غسل اليدين جيداً، ووضع موزعات مطهر اليدين في أماكن بارزة في مكان العمل ، تخصيص أماكن للمواجدين لغسل أيديهم بالماء والصابون

Ref. : W.H.O

• لقاحات فيروس كورونا المستجد

صممت هذه اللقاحات لتفعيل الجهاز المناعي للجسم على التعرف على الفيروس المسبب لـ كوفيد-19 ووقفه على نحو مأمون

• أنواع اللقاحات



١. لقاحات الفيروس المعدل [سينوفاك]

لقاحات تستخدم شكل غير فعال من الفيروس تم تعطيله أو إضعافه حتى لا يسبب المرض ولكنها يحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة.

٢. لقاحات الناقل الفيروسيّة (أسترلينكا جونسون)

لقاحات تستخدم فيروس تم تصنيعه معملياً لا يسبب المرض ولكن يتحفز بروتينات فيروس كورونا التي تحفز استجابة جهاز المناعة

٣. اللقاحات القائمة على البروتين

عبارة عن جزء من بروتين فيروس كورونا يقوم بتحفيز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة

٤. لقاحات الحمض النووي

طريقة جديدة تعطي تعليمات للخلايا لبناء بروتين يحفز الاستجابة المناعية بأمان



Ref. WHO

• ما هي فوائد اللقاح

- الدعم من مخاطر الإصابة بالمرض نتيجة لتفعيل الأنسجة المناعية ضد الفيروس.
- حماية الأشخاص المحيطين بك من دعوى الفيروس.
- بشدة لمخاطر الإصابة بالمضاعفات الخطيرة لـ كوفيد-19 مثل (مقدمي الرعاية الصحية، كبار السن وسائر الأشخاص المصابين بأمراض أخرى).

• من ينبغي أن

يتلقى لقاحات كوفيد-19

اللقاحات آمنة لمعظم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ١٨ عاماً وأكثر بما فيهم الأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية سابقة بمحاذيف الواقعها بما في ذلك اضطرابات الملاعة الذاتية، وتشمل هذه الحالات المرضية :

- ارتفاع ضغط الدم، السكري
- الربو والامراض الرئوية
- امراض القلب والكلري

ما عدا ثلاثة فئات لابد من استشارة مقدم

- الرعاية الصحية
- الاشخاص التي تعانى من نقص في الدهون ال酬ائية
 - السيدات الدواميات، المعرضات قاربة من الحساسية الشديدة لجهة أي لقاح



Ref. WHO

• هل ينبغيأخذ اللقاح حتى لو سبق الإصابة بالفيروس

• المجموعة التي يكتسبها الأفراد من التطعيم بعد الإصابة سابقاً يعود إلى كوفيد-19 تكون قوية وبطبي الفرد بالذئبانية لفترة أطول.

• ما هي الأعراض الجانبية

- تعب عام في الجسم ، ألم في مختلف عضلات الجسم
- ارتفاع طفيف في درجة الحرارة
- فشل عصبي وصداع
- ألم وتوتر في مكان إعطاء حقنة
- الملاجئ قد يسبب اللقاح رد فعل عدسي في بعض الحالات الشديدة والتي تظهر مباشرة بعد تلقي اللقاح

• هل من الممكن للشخص الذي تلقى اللقاح أن يصاب بالعدوى

• لا تكون لديك مستويات كبيرة من الحماية بعد الحصول على التطعيم لمدة ١٤ يوم حيث أن الحماية تزداد تدريجياً فمن الممكن إصابتك بالعدوى خلال ١٤ يوم مباشرةً من تلقي اللقاح

• لقاح الجرعة الواحدة :

الحماية تحدث بشكل كامل بعد أسبوعين من التطعيم

• لقاح الجرعتين :

لابد من تكميل الجرعتين لتحقيق أعلى مستوى ممكن من المناعة

Ref. WHO